



Bibliographische Daten

Titel: Flora des Regnitzgebietes
Ersteller: Christian Kittler
Signatur: Amb. 8. 2902

Die Nutzung der Digitalisate von gemeinfreien Werken aus den Sammlungen der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg ist gemäß den Bedingungen der [Creative-Commons-Lizenz Public Domain Mark 1.0](#) uneingeschränkt und kostenfrei erlaubt.

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis wird gebeten, bei der Verwendung von durch die Stadtbibliothek im Bildungscampus überlassenen Digitalisaten stets die Quellenangabe in folgender Form zu verwenden: Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, [Bestandssignatur + Blatt/Seite]

Im Interesse einer laufenden Dokumentation und der Information für Benutzerinnen und Benutzer erbittet die Stadtbibliothek die Überlassung von Belegexemplaren oder Sonderdrucken von Veröffentlichungen, die aus der Benutzung von Handschriften und anderen Medien in den historischen Sammlungen der Stadtbibliothek hervorgegangen sind. Sollte eine Abgabe nicht möglich sein, wird um Mitteilung der bibliographischen Daten der Publikation gebeten.

- cc. Blumenkrone 5 blättrig, Kelch 5 blättrig.
 * Bäume. Familie der Lindengewächse. Tiliaceen. Fam. 2.
 ** Am Boden liegende, niedrige Halbsträucher mit gelben Blüten.
 Familie der Cistrogengewächse. Cistaceen. Fam. 3.
- dd. Blumenkrone vielblättrig, Kelch 4 oder 5 blättrig. Wasserpflanzen.
 Familie der Scerojen. Nymphaeaceen. Fam. 4.

b. Mit 2 bis vielen Griffeln.

Familie der Hahnenfußgewächse. Ranunculaceen. Fam. 5.

2. Die zahlreichen freien Staubgefäße sind einer am Kelche befindlichen Scheibe (Kelchrand) eingefügt. XII.

a. Mit 1 Griffel.

aa. Blätter wechselständig; Frucht eine einsamige Steinfrucht.
 Familie der Steinfrüchtler. Drupaceen. Fam. 6.

bb. Blätter gegenständig; Frucht eine 4 bis 5 fächerige Kapfel.
 Familie der Pfeifenstrauchgewächse. Philadelphaceen.
 (Ziersträucher.) Fam. 7.

b. Mit 2 bis 5 Griffeln.

aa. Kelch und Krone oberständig; Frucht fleischig, mit dem Kelche gekrönt.

Familie der Apfelsrüchtler. Pomaceen. Fam. 8.

bb. Kelch und Krone unterständig; Frucht nicht fleischig.

Aus der Familie der Rosaceen. Fam. 9.

* Blüten zwittrig: Spiraea, Filipendula.

** Blüten 2 häufig: Aruncus.

*** Blüten 1 häufig: Sanguisorba officinalis.

c. Mit 6 bis vielen Griffeln.

Familie der Rosen. Rosaceen. Fam. 9.

3. Die zahlreichen Staubgefäße sind in 1 Bündel verwachsen. XVI.

Familie der Malven. Malvaceen. Fam. 10.

4. Die zahlreichen Staubgefäße sind in 3 bis 6 Bündel verwachsen. XVIII.

Familie der Johanniskräuter. Hypericaceen. Fam. 11.

B. Mit 12 bis 18 freien Staubgefäßen. XI.

a. Mit 1 Griffel.

1. Blumenkrone meist 5 blättrig, gelb, Kelch 2 spaltig.

Portulak. Portulaca. (Portulacaceen). Fam. 12.

2. Blumenkrone meist 6 blättrig (4 bis 6), rot, Kelch 8 bis 10 zählig.

Weiderich. Lythrum. (Lythraceen). Fam. 13.