



Bibliographische Daten

Titel: Flora des Regnitzgebietes
Ersteller: Christian Kittler
Signatur: Amb. 8. 2902

Die Nutzung der Digitalisate von gemeinfreien Werken aus den Sammlungen der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg ist gemäß den Bedingungen der [Creative-Commons-Lizenz Public Domain Mark 1.0](#) uneingeschränkt und kostenfrei erlaubt.

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis wird gebeten, bei der Verwendung von durch die Stadtbibliothek im Bildungscampus überlassenen Digitalisaten stets die Quellenangabe in folgender Form zu verwenden: Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, [Bestandssignatur + Blatt/Seite]

Im Interesse einer laufenden Dokumentation und der Information für Benutzerinnen und Benutzer erbittet die Stadtbibliothek die Überlassung von Belegexemplaren oder Sonderdrucken von Veröffentlichungen, die aus der Benutzung von Handschriften und anderen Medien in den historischen Sammlungen der Stadtbibliothek hervorgegangen sind. Sollte eine Abgabe nicht möglich sein, wird um Mitteilung der bibliographischen Daten der Publikation gebeten.

2. Krone glockig, hellblau, am Grunde weiß; Kelch 5 teilig, 5 kantig, sich stark vergrößernd, die gelbliche, trockene, 4 bis 5 fächerige Beere einschließend. *Nicandra*. 260.

B. Frucht eine 2 bis 4 fächerige Kapsel.

- a. Kapseln mit Stacheln, 4 fächerig; Krone trichterförmig, mit 5 spaltigem Saum, weiß; Kelch am Grunde ringsum abspringend. *Datura*. 264.

b. Kapseln ohne Stacheln.

1. Kapseln mit einem Deckel aufspringend, bauchig, 2 fächerig; Krone trichterförmig, schmutzig—gelb. Blüten in 2 Längsreihen. *Hyoscyamus*. 262.
2. Kapseln durch Zähne aufspringend, eiförmig, 2 bis 4 fächerig; Krone trichterförmig mit 5 spaltigem Saum, rot oder gelblichgrün; Blüten rülpig. *Nicotiana*. 263.

257. *Lycium* L. Bocksdorn, Teufelszwirn.

L. halimifolium Miller (*L. barbarum*) gemeiner Bocksdorn. Strauch mit überhängenden Ästen und dornigen Zweigen; Blätter gestielt, länglich oder lanzettlich; Blüten einzeln oder zu 2 bis 5, violett, zuletzt braun sich färbend; Kelch glockig, 2 lippig oder ungleich 3 bis 5 teilig; Beere länglich, mennigrot. An Hecken und Zäunen, oft verwildert. Juni bis September.

L. rhombifolium Dippel. Rautenblättriger Bocksdorn. Zweige meist dornenlos; Blätter breit-elliptisch, fast rhombisch; Blüten meist einzeln; Kelch 4 bis 5 zählig; Beere länglich, orangew. Hecken und Zäune.

258. *Solanum* L. Nachtschatten.

A. Stengel krautig; Krone weiß.

542. *S. nigrum* L. Schwarzer Nachtschatten. Blätter eiförmig, buchtig—gezähnt, nebst dem Stengel mit gekrümmten Haaren besetzt; Äste rund, Fruchtsüßchen an der Spitze verdickt, herabgebogen; Krone weiß; Beeren schwarz, rund. Wege Schutt, bebaute Orte. Juli bis Oktober.